

江吴萸

【药材来源】本品为芸香科植物吴茱萸 *Euodia rutaecarpa* (Juss.) Benth.、石虎 *Euodia rutaecarpa* (Juss.) Benth. var. *officinalis* (Dode) Huang 或疏毛吴茱萸 *Euodia rutaecarpa* (Juss.) Benth. var. *bodinieri* (Dode) Huang 的干燥近成熟果实。

【品种沿革】吴茱萸别名吴萸、茶辣、漆辣子、优辣子、气辣子。始载于《神农本草经》，被列为中品，书中曰：“一名藪。生山谷。”

南北朝时期《名医别录》记载：“生上谷及宛胸。”上谷即今山西与河北边境附近，宛胸为今山东菏泽地区。

唐代《本草拾遗》在食茱萸项下记载：“且茱萸南北总有，以吴（今江苏南部、浙江北部、安徽、江西一带）为好，所以有吴之名。两处俱堪入食，若充药用，要取吴者。”这里南北是地域上的概说，意即吴茱萸的分布范围较广，入药应选产自吴地者，这在一定程度上明确了吴茱萸道地药材的历史地位。

宋代《本草图经》记载：“生上谷川谷及冤句。今处处有之，江浙、蜀汉尤多。”江浙指今江苏、浙江、安徽等地，蜀汉指今四川及云南、贵州北部、陕西汉中一带。并附临江军（今江西樟树）吴茱萸和越州（今浙江绍兴）吴茱萸图，结合形态描述来看，越州吴茱萸应是石虎 *Euodia rutaecarpa* (Juss.) Benth. var. *officinalis* (Dode) Huang。

明代《本草品汇精要》记载：“〔道地〕临江军、越州、

吴地。”《本草纲目》记载：“茱萸枝柔而肥，叶长而皱，其实结于梢头，累累成簇而无核，与椒不同。一种粒大，一种粒小，小者入药为胜。”李时珍对吴茱萸性状的描述与今之吴茱萸商品基本一致，并以小粒者质优，其中大粒吴茱萸应可能来源于今之吴茱萸 *Euodia rutaecarpa* (Juss.) Benth., 小粒吴茱萸可能来源于今之石虎 *Euodia rutaecarpa* (Juss.) Benth. var. *officinalis* (Dode) Huang 或疏毛吴茱萸 *Euodia rutaecarpa* (Juss.) Benth. var. *bodinieri* (Dode) Huang。

民国时期《增订伪药条辨》记述：“吴茱萸，上春出新。湖南长沙、安化及广西出者，粒大梗亦多，气味触鼻，皆佳。浙江严州出者，粒细梗少，气味略薄，亦佳。”《药物出产辨》记载：“产湖南常德府为最，广西左江亦佳，右江虽略逊，亦作好论。”

通过对历代本草文献进行梳理发现，吴茱萸应来源于芸香科植物吴茱萸、石虎或疏毛吴茱萸，与 2015 年版《中华人民共和国药典》一部规定相一致。吴茱萸南北均产，以产吴地者入药为胜而得名，古代主要产于临江军、越州、吴地等，并形成今之“江吴萸”（主产于江西樟树）、“杜吴萸”（主产于浙江北部）、“常吴萸”（主产于湖南西部、贵州东北部、重庆东南部各地，历来因集散于常德而得名）等道地药材。

【产地沿革】有关吴茱萸产地的记载较广，最早记载其产于河北、山东等北方地区；南北朝以后逐渐转移到南方地区；在宋代主要产地增加了四川、陕西等地，并形成了以江西樟树、浙江北部、贵州北部为核心的道地产区。江吴萸产地沿革见表

1。

表1 江吴萸产地沿革

年代	出处	产地及评价
唐	《本草拾遗》	且茱萸南北总冇,以吴(今江苏南部、浙江北部、安徽、江西一带)为好,所以冇吴之名。两处俱堪入食,若充药用,要取吴者
明	《本草品汇精要》	〔道地〕临江军(今江西樟树)、越州(今浙江绍兴)、吴地(今江苏南部、浙江北部、安徽、江西一带)

【道地产区】江西樟树及周边山地、丘陵、平坝向阳地区。

【性状特征】吴茱萸呈球形或略呈五角状扁球形,直径2mm~5mm。表面暗黄绿色至褐色,粗糙,冇多数点状突起或凹下的油点。先端有五角星状的裂隙,基部残留被有黄色茸毛的果梗。质硬而脆,横切面可见子房5室,每室有淡黄色种子1粒。气芳香浓郁,味辛辣而苦。

江吴萸多为大粒吴萸,商品又称“中花吴萸”。多呈五角状扁球形,直径2.5mm~4mm。表面青绿色,粗糙,冇多数点状突起或凹下的油点。先端有五角星状的裂隙,不开口。气芳香浓郁,味辛辣而苦。

江吴萸与其他产地吴茱萸性状鉴别要点见表2。

表2 江吴萸与其他产地吴茱萸性状鉴别要点

比较项目	江吴萸	其他产地吴茱萸
------	-----	---------

外形	扁球形,颗粒大,均匀,不开口,直径 2.5mm~4mm	颗粒小,或大小不均匀,直 径2mm~5mm
颜色	表面青绿色	绿色,黄绿色或绿褐色