

# 东银花

【药材来源】本品为忍冬科植物忍冬 *Lonicera japonica* Thunb. 的干燥花蕾或带初开的花。

【品种沿革】金银花又名忍冬，现存最早记载“忍冬”的医学文献是晋代葛洪的《肘后备急方》，云：“忍冬茎叶挫数茎煮。”首载“忍冬”的本草学专著是南北朝时期《名医别录》，云：“味甘，温，无毒。主治寒热、身肿，久服轻身，长年，益寿。十二月采，阴干。”南北朝时期陶弘景《本草经集注》记载：“今处处皆有，似藤生凌冬不凋，故名忍冬。”其后历代本草专著均有记载。

对金银花原植物形态的描述始见于唐代《新修本草》，云：“此草藤生，绕覆草木上，苗茎赤紫色，宿者有薄白皮膜之，其嫩茎有毛。叶似胡豆，亦上下有毛。花白蕊紫。”此应为忍冬属忍冬组缠绕亚组植物。宋代《苏沈良方》首次以“金银花”药名收载该药，并对其植物形态有详细的描述：“叶尖圆茎生，茎叶皆有毛，生田野篱落，处处有之，两叶对生。春夏新叶梢尖，而色嫩绿柔薄，秋冬即坚厚，色深而圆，得霜则叶卷而色紫，经冬不凋。四月开花，极芬，香闻数步，初开色白，数日则变黄。每黄白相间，故一名金银花。”与今忍冬 *Lonicera japonica* Thunb. 形态一致。

明代《本草品汇精要》《本草纲目》《本草原始》等本草中均有对金银花植物形态的描述，且《本草原始》所附忍冬

图与今忍冬 *Lonicera japonica* Thunb. 完全一致, 可以判定明代所用中药金银花即忍冬科植物忍冬 *Lonicera japonica* Thunb.。

清代《本草备要》《植物名实图考》均附有金银花植物图, 均与今金银花植物形态一致, 且《植物名实图考》记载了金银花的道地产地: “吴中暑月, 以花入茶饮之, 茶肆以新贩到金银花为贵, 皆中州产也。”“中州”即今河南一带。

综上所述, 金银花早期以忍冬之名入药, 且以茎叶用药为主, 宋代以来逐步划分成两个药材, 从历代所描述的植物形态, 结合药图及其分布来看, 历代所用的主流品种为忍冬科植物忍冬 *Lonicera japonica* Thunb.。

**【产地沿革】**宋代以前主要以忍冬全株嫩苗或茎叶入药, 宋代以后医家开始将忍冬藤与金银花分别入药。宋代《曲洧旧闻》最早记载了金银花的产地: “(金银花) 郑许田野间二三月有。一种花蔓生, 其香清远, 马上闻之, 颇似木樨, 花色白, 土人呼为鹭鸶花, 取其形似也。亦谓五里香。”郑许指南宋时期的郑州和许州, 在南宋时期属于金的辖地, 属于南京路, 即与今河南郑州、许昌位置大致相当。

明代朱橚所编的《救荒本草》记载了金银花的产地: “金银花, 本草, 名忍冬, 一名鹭鸶藤, 一名左缠藤, 一名金钗股, 又名老翁须, 亦名忍冬藤。旧不载所出州土, 今辉县山野中亦有之。”这里指出金银花生于“辉县山野中”。明代辉县属于

河南布政司，与今河南辉县位置大致相当。

清代嘉庆年间（1817）的《密县志》即记载该县“金银花鲜者香味甚浓，山中种植者多，颇获利”。《植物名实图考》云：“忍冬，吴中暑月，以花入茶饮之，茶肆以新贩到金银花为贵，皆中州产也。”这里的中州指河南，因其地在古九州之中得名。

民国时期曹炳章的《增订伪药条辨》记载：“（金银花）以河南所产为良……产河南淮庆者为淮密……禹州产者曰禹密……济南出者为济银……亳州出者……更次。湖北广州出者……不堪入药。”《药物出产辨》记载：“顶蜜花产河南禹州府蜜县，名曰蜜银花。中蜜花产山东济南府，名曰济银花。又有一种净山银花，由镇江来。广东产者为土银花，广西亦有产，均名土银花，稍次。以上均秋夏出新。”

《药材资料汇编》记载：“济银花，产山东沂蒙山区，以费县、平邑为主要产地。”《中国中药区划》（1995）记载：“山东省是我国金银花主要传统产地之一，栽培历史近200年。”。

综上分析，清以前金银花主产地为河南。自清末民国初以来，逐步形成河南、山东两大知名产区，其中河南的密银花与山东的济银花为中医临床所推崇，济银花因在济南集散而得名，主产于沂蒙山区等地，又称“东银花”。东银花产地沿革见表1。

表 1 东银花产地沿革

年代	出处	产地及评价
宋	《曲洧旧闻》	郑许田野间二三月有。一种花蔓生，其香清远，马上闻之……鹭鸶花……五里香
明	《救荒本草》	金银花，本草，名忍冬……旧不载所出州土，今辉县山野中亦有之
	《密县志》	金银花鲜者香味甚浓，山中种植者多，颇获利
清	《植物名实图考》	忍冬，吴中暑月，以花入茶饮之，茶肆以新贩到金银花为贵，皆中州（今河南）产也
民国	《增订伪药条辨》	济南出者为济银
	《药物出产辨》	中蜜花产山东济南府，名曰济银花
现代	《药材资料汇编》	济银花，产山东沂蒙山区，以费县、平邑为主要产地

**【道地产区】**以山东平邑为核心的沂蒙山区以及周边费县、蒙阴等区域的浅山丘陵地区。

**【性状特征】** 金银花呈棒状，上粗下细，略弯曲，长 2cm-3cm，上部直径约 0.3cm，下部直径约 0.15cm。表面黄白色或绿白色，密被短柔毛，偶见叶状苞片，花萼绿色，先端 5 裂。裂片有毛，长约 0.2cm。开放者花冠筒状，先端二唇形；雄蕊 5，附于筒壁，黄色；雌蕊 1，子房无毛。气清香，味淡，微苦。

东银花以大白、二白为主，花蕾肥大饱满，表面颜色黄白，香气浓郁。