

山东徐长卿

【药材来源】本品为萝藦科植物徐长卿 *Cynanchum paniculatum* (Bge.) Kitag. 的干燥根和根茎。

【品种沿革】徐长卿始载于《神农本草经》，被列为上品，云：“味辛、温。主鬼物，百精，蛊毒，疫疾邪恶气，温疟。久服强悍轻身。一名鬼督邮。生山谷。”

魏晋时期《吴普本草》记载：“一名石下长卿。或生陇西。三月采。”“陇”为古时山名，绵延于甘肃、陕西交界处，“陇西”为陇山以西，大概是今甘肃六盘山以西、黄河以东一带。南北朝时期《名医别录》记载：“生太山及陇西，三月采。”《本草经集注》记载：“鬼督邮之名甚多，今世用徐长卿者，其根正如细辛，小短扁扁尔，气亦相似。今狗脊散用鬼督邮，当取其强悍宜腰脚，所以知是徐长卿，而非鬼箭、赤箭。”

“太山”即今之泰山，位于山东境内。

唐代苏敬《新修本草》记载：“此药，叶似柳，两叶相当，有光润，所在川泽有之。根如细辛，微粗长，而有臊气。今俗用代鬼督邮，非也。”《蜀本草》记载：“生下湿川泽之间，今所在有之。”并云：“苗似小麦，两叶相对，三月苗青，七月、八月着子，似萝藦子而小，九月苗黄，十月凋。”根据以上描述，应为萝藦科植物徐长卿 *Cynanchum paniculatum* (Bge.) Kitag.。

宋代唐慎微《证类本草》记载：“生太山山谷及陇西。

三月采。”苏颂《本草图经》记载：“生泰山山岩谷及陇西，今淄、齐、淮、泗间亦有之，三月生青苗、叶似小桑，两两相当，而有光润；七八月着子，似萝藦而小。九月苗黄，十月而枯，根黄色，似细辛微粗长，有臊气。三月、四月采，一名别仙踪。”

“淄”为今山东的淄河；“齐”为今山东泰山以北黄河流域和胶东半岛地区；“淮”为今淮河流域；“泗”为今山东泗水。对于植物形态的描述与《蜀本草》相似，并更加细致。

明代陈嘉谟《本草蒙筌》记载：“淄齐淮间俱有，卑湿川泽皆生。”李时珍《本草纲目》引用《吴普本草》之言，描述为：“徐长卿一名石下长卿。其为一物甚明，但石间生者为良。”朱橚《救荒本草》记载：“生密县梁家衡山野中，苗高二三尺，叶似细柳叶，更又细长而尖，叶皆两两插茎对生，叶间开淡黄花，结尖角儿，长二寸许，粗如萝卜，角中有白穰及小扁黑子，其叶味甘。”

清代吴其濬《植物名实图考》引《蜀本草》“子似萝藦子而小，核其形状，盖即湖南仅医所谓土细辛”。根据这些描述，应为萝藦科植物徐长卿 *Cynanchum paniculatum* (Bge.) Kitag.。

综上所述，历代本草记载的徐长卿应是现在应用的品种，即萝藦科植物徐长卿 *Cynanchum paniculatum* (Bge.) Kitag.。

【产地沿革】本草文献记载徐长卿主要分布于我国东部及西北地区，南北朝时期《名医别录》记载：“生太山及陇西，三

月采。”“陇西”为陇山以西,大概是今甘肃六盘山以西、黄河以东一带。宋代苏颂《图经本草》记载:“生泰山山岩谷及陇西,今淄、齐、淮、泗间亦有之。”“淄”为今山东的淄河;“齐”为今山东泰山以北黄河流域和胶东半岛地区;“淮”为今淮河流域,“泗”为今山东泗水。自古山东就是徐长卿的主要产区,在山东境内徐长卿主要分布于泰沂山区及周边地区。近代书籍记载徐长卿分布较广,如《中华本草》对徐长卿产地的描述为:“分布于东北、华东、中南、西南及内蒙古、河北、陕西、甘肃。”徐长卿是常用中药材,过去一直使用野生品,20世纪80年代在山东临沂山区开始野生变家种,山东泰沂山区及周边地区是目前徐长卿药材主要的人工种植区。山东徐长卿产地沿革见表1。

表1 山东徐长卿产地沿革

年代	出处	产地及评价
秦汉	《神农本草经》	一名鬼督邮。生山谷
南北朝	《本草经集注》	生太山山谷及陇西,三月采。鬼督邮之名甚多,今世用徐长卿者,其根正如细辛,小短扁扁尔,气亦相似。今狗脊散用鬼督邮,当取其强悍宜腰脚,所以知是徐长卿,而非鬼箭、赤箭
	《名医别录》	生太山及陇西,三月采
魏晋	《吴普本草》	一名石下长卿。或生陇西

唐	《新修本草》	生太山山谷及陇西，三月采。所在川泽有之。此药，叶似柳，两叶相当，有光润，所在川泽有之。根如细辛，微粗长，而有臊气。今俗用代鬼督邮，非也
宋	《证类本草》	生太山山谷及陇西。三月采
	《本草图经》	生泰山山岩谷及陇西，今淄、齐、淮、泗间亦有之。三月生青苗，叶似小桑，两两相当，而有光润；七、八月着子，似萝藦而小；九月苗黄，十月而枯，根黄色，似细辛微粗长，有臊气。三月、四月采，一名别仙踪
明	《本草蒙筌》	淄齐淮间俱有，卑湿川泽皆生
	《本草纲目》	徐长卿一名石下长卿。其为一物甚明，但石间生者为良
清	《植物名实图考》	子似萝藦子而小，核其形状盖即湖南俚医所谓土细辛
现代	《中华本草》	分布于东北、华东、中南、西南及内蒙古、河北、陕西、甘肃

【道地产区】以山东泰沂山区为核心及周边地区。

【性状特征】徐长卿根茎呈不规则柱状，有盘节，长0.5cm-3.5cm，直径2mm-4mm。有的顶端带有残茎，细圆柱形，长约2cm，直径1mm-2mm，断面中空；根茎节处周围着生多数根。根呈细长圆柱形，弯曲，长10cm-16cm，直径1mm-1.5mm。表面

淡黄白色至淡棕黄色或棕色,具微细的纵皱纹,并有纤细的须根。质脆,易折断,断面粉性,皮部类白色或黄白色,形成层环淡棕色,木部细小。气香,味微辛、凉。

山东徐长卿根茎长 0.5cm-5cm, 直径 3mm-7mm。先端带有茎基, 直径 1mm-5mm。根茎节间短, 节处膨大, 周围着生多數细根。根长 10cm-25cm, 直径 1mm-1.8mm。质脆,易折断,断面平坦,粉性。皮部黄白色,形成层环淡棕色,木部细小,棕色。香气浓,味微辛、凉。

山东徐长卿与其他产地徐长卿性状鉴别要点见表 2。

表 2 山东徐长卿与其他产地徐长卿性状鉴别要点

比较项目	山东徐长卿	其他产地徐长卿
形状	山东野生徐长卿根茎呈不规则柱状,有盘节,长 0.5cm-5cm, 直径 3mm-7mm。有的先端带有残茎,细圆柱形,直径 1mm-5mm,断面中空;根茎节处周围着生多數根。根呈细长圆柱形,弯曲,长 10cm-25cm, 直径 1mm-1.8mm。表面淡黄白色至淡棕黄色或棕色,具微细的纵皱纹,并有纤细的须根。质脆,易折断,断面粉性,皮部黄白色,形成层环淡棕色,木部细小,棕色	根茎呈不规则柱状,长 0.5cm-3.5cm, 直径 2mm-4mm。根呈细长圆柱形,弯曲,长 10cm-16cm, 直径 1mm-1.5mm

直径	根茎呈不规则柱状，直径3mm-7mm。根呈细长圆柱形，直径1mm-1.8mm	根茎直径 2mm-4mm。根直径 1mm-1.5mm
先端	有的根茎先端带有残茎	根茎先端常有残茎
质地	质脆，易折断	质脆易断
断面	断面粉性	断面粉性
气味	香气浓，味微辛、凉	气香，味微辛、凉