

桂郁金

【药材来源】本品为姜科植物广西莪术 *Curcuma kwangsiensis* S. G. Lee et C. F. Liang 的干燥块根。

【品种沿革】郁金始载于《药性论》。《新修本草》记载：“此药苗似姜黄，花白质红，末秋出茎，心无实，根黄赤，取四畔子根，去皮，火干之。生蜀地及西戎，马药用之。破血而补，胡人谓之马蓬……（姜黄）叶、根都似郁金，花春生于根，与苗并出。夏花烂，无子。根有黄、青、白三色。其作之方法，与郁金同尔。西戎人谓之蓬药，其味辛少、苦多，与郁金同，惟花生异尔。”宋代《本草图经》记载：“（蓬莪茂）三月生苗，在田野中，其茎如钱大，高二三尺。叶青白色，长一二尺，大五寸已来，颇类蘘荷。五月有花作穗，黄色，头微紫，根如生姜，而茂在根下，似鸡鸭卵，大小不常。九月采，削去粗皮，蒸熟，暴干用……江浙或有之……（郁金）今广南、江西州郡亦有之，然不及蜀中者佳。”并附图“温州蓬莪茂”和“端州（今广东肇庆）蓬莪茂”。从所附图结合形态描述及今植物分布来看，宋代所用郁金当为今姜黄属多种植物，“温州蓬莪茂”即现今的温郁金 *Curcuma wenyujin* Y. H. Chen & C. Ling，“端州蓬莪茂”从“花序从叶鞘中抽出”“三月生苗”“五月有花”来看，应是广西莪术 *Curcuma kwangsiensis* S. G. Lee et C. F. Liang 或蓬莪术 *Curcuma phaeocaulis* Val.。《本草图经》姜黄条附有“澧州姜黄”和“宜州姜黄”图。“澧

州”为今湖南境内，因图无花难以确定其品种。“宜州”为今广西河池宜州，图中所绘的花序是从叶丛中抽出，而且高于叶长，此植物与姜黄特征相似，但开花季节与记载不符，就产地、花期和根茎断面色泽等推断“宜州姜黄”可能为广西莪术 *Curcuma kwangsiensis* S. G. Lee et C. F. Liang。《本草纲目》将蓬莪茂释名为“逐药”，然而“逐”在郁金、姜黄条内亦有。《本草蒙筌》记载：“体圆有节，类蝉肚者真。”清代《本经逢原》云：“若大小不等……折之中空、质柔、内外皆黄、其气烈者，即片子姜黄也。体圆，首尾相似，通身横纹，发苗处无小孔，折开气烈触鼻者，染色姜黄中之小者也。蓬术则大块、色青黑，最大者为广茂。”《植物名实图考》载郁金，“以根为螳螂肚者为真”。《增订伪药条辨》记载：“郁金，山草之根，野生也。两广、江西咸有之，而以蜀产者为甚……然老郁金虽产四川，近今名称广郁金。所谓川郁金，乃温州产也，色黯黑，形扁亦有心，惟不香耳……甚则以姜黄辈伪之者，然其形锐圆，如蝉腹状，根梢有细须一缕，如菱脐之苗，长一二寸，市人因呼金线蝦蟆，蝉肚郁金是也。其皮黄白，有皱纹，而心内黄赤，剗开俨然两层，如井栏。”上述记载“根梢有细须一缕”“因呼金线蝦蟆，蝉肚郁金是也，其皮黄白有皱纹”“蝉肚郁金”等性状特征，表明了药用部位转变为姜黄属的植物的块根，因细须与块根相连，而且形成一缕，似“金线”“蝦蟆”“蝉腹（肚）”等很形象地说明药用部位是块根。

因此，由上述可推断，古代桂郁金为广西莪术 *Curcuma kwangsiensis* S. G. Lee et C. F. Liang 的块根。

【产地沿革】古代关于姜黄属多种植物的药用部位不十分明确，近代以来逐步形成温郁金 *Curcuma wenyujin* Y. H. Chen & C. Ling、姜黄 *Curcuma longa* L.、广西莪术 *Curcuma kwangsiensis* S. G. Lee et C. F. Liang 或蓬莪术 *Curcuma phaeocaulis* Val. 的干燥块根作为郁金入药，前两者分别习称“温郁金”和“黄丝郁金”，按照性状不同习称“桂郁金”或“绿丝郁金”。而广西等地所产的广西莪术的块根即“桂郁金”均为广西道地药材。经文献及实地考察证实，广西钦州灵山（陆屋、广江、广隆、三隆、太平、伯劳等地）、玉林博白、河池及其周边适宜地区为郁金的主产区。桂郁金产地沿革见表 1。

表 1 桂郁金产地沿革

年代	出处	产地及评价
唐	《新修本草》	生蜀地及西戎，马药用之
宋	《本草图经》	“今广南、江西州郡亦有之，然不及蜀中者佳……（蓬莪茂）江浙或有之。”并附图“温州蓬莪术茂”和“端州蓬莪术茂”
明	《本草纲目》	今广南、江西州郡亦有之，然不及蜀中者佳
民国	《药物出产辨》	两广、江西咸有之，而以蜀产者为甚……然老郁金虽产于四川，近今名称广郁金。所谓川郁

		金，乃温州产也，色黯黑，形扁亦有心，惟不香耳
--	--	------------------------

【道地产区】广西钦州灵山（陆屋、广江、广隆、三隆、太平、伯劳等地）、玉林博白、河池及其周边适宜地区。

【性状特征】桂郁金呈长圆锥形或长圆形，长 2cm-6.5cm，直径 1.8cm-2cm。表面具疏浅纵纹或较粗糙网状皱纹。质坚实，断面角质状，浅棕色。气微，味微辛、苦。

桂郁金与其他产地郁金性状鉴别要点见表 2。

表 2 桂郁金与其他产地郁金性状鉴别要点

比较项目	桂郁金	其他产地郁金
外观	长圆锥形或长圆形	长圆形、卵圆形、纺锤形或长椭圆形
外表面色泽	浅棕黄色	灰黄色或灰棕色、灰黄或灰白色、灰褐色
断面	淡白色或黄白色	灰黑色或棕褐色、淡黄色