

滁菊

【药材来源】本品为菊科植物菊 *Chrysanthemum morifolium* Ramat. 的干燥头状花序。

【品种沿革】菊花始载于《神农本草经》，被列为上品，书中未言产地，但著有生境，谓：“生川泽及田野。”最早记载菊花产地的是《名医别录》，曰：“菊花，生雍州及田野。”雍州，即今陕西凤翔一带。《证类本草》引陶隐居云：“南阳郦县最多，今近道处处有。”《本草图经》引唐《天宝单方图》云：“白菊，元生南阳山谷及田野中……诸郡皆有。”南阳及南阳郦县，均为今河南南阳境。根据以上文献所记载的产地和生境可以看出，宋以前我国药用菊花应是取之于野生品类。

西晋张华《博物志》是较早记录菊花品类的文献。张氏曰：“菊有两种，苗花如一，惟味小异，苦者不中食。”南北朝时期陶弘景《本草经集注》注文云：“菊有两种，一种茎紫、气香、味甘，叶可作羹食者，为真；一种青茎而大，作蒿艾气，味苦不堪食者，名苦薏，非真。其华正相似，唯以甘苦别之尔……又有白菊，茎、叶都相似，唯花白。”

唐代《新修本草》转录了陶氏之说。《本草图经》引唐《天宝单方图》云：“白菊，颍川人呼为回蜂菊，汝南名茶苦蒿，上党及建安郡、顺政郡并名羊欢草，河内名地薇蒿。”颍川、汝南、河内，均为今河南境；上党，即今山西长治；建安郡，即今福建境；顺政郡，即今陕西略阳。根据以上文献记载的

“青茎而大，作蒿艾气，味苦不堪食者，名苦薏”的品种，经考证，应是现今菊科植物野菊 *Chrysanthemum indicum* L.。而“茎紫、气香、味甘，叶可作羹食者”，按其产地、形态特征，对照《中国植物志》收载的 17 种菊属植物，认为该品应是现今菊科植物甘菊 *Chrysanthemum lavandulifolium* (Fisch. ex Trautv.) Makino 或其变种。至于陶氏所言和唐《天宝单方图》记载的白菊，按其产地、花色推断，很可能是紫花野菊 *Chrysanthemum zawadskii* Herbich 或毛华菊 *Chrysanthemum vestitum* (Hems1.) stapf。但据唐《天宝单方图》述及的产地有河南、陕西、山西、福建等，故认为紫花野菊的可能性更大。

宋代苏颂《本草图经》记载：“菊花，生雍州川泽及田野，今处处有之，以南阳菊潭者为佳……然菊之种类颇多，有紫茎而气香，叶厚至柔嫩可食者，其花微小，味甚甘，此为真。有青茎而大，叶细作蒿艾气味苦者，华亦大，名苦薏，非真也。”又云：“南阳菊亦有两种：白菊，叶大似艾叶，茎青，根细，花白，蕊黄；其黄菊，叶似茼蒿，花、蕊都黄……南京又有一种开小花，花瓣下如小珠子，谓之珠子菊，云入药亦佳。”南阳菊潭，即今河南内乡；南京，即今河南商丘。寇宗奭《本草衍义》云：“近世有二十余种，惟单叶、花小而黄绿，叶色深小而薄，应候而开者是也。《月令》所谓菊有黄华者也。又邓州白菊，单叶者亦入药，余医经不用。”按《本草图经》所载“今处处有

之，以南阳菊潭者为佳”，说明宋代仍应用野生菊类。考“紫茎而气香，花微小，味甚甘者”和“青茎而大，叶作蒿艾气，味苦者花亦大，名苦薏”，前者是甘菊 *Chrysanthemum lavandulifolium* (Fisch. ex Trautv.) Makino, 后者无疑是野菊 *Chrysanthemum indicum* L.。对照《中国植物志》所载甘菊的花序直径为 1cm-1.5cm, 野菊的花序直径为 1.5cm-2.5cm, 显然甘菊的花小于野菊的花，此描述与苏颂所说相符。从苏氏和寇氏的载文看，宋代菊花品种明显多于宋以前。《本草纲目》云：“菊之品，凡百种，宿根自生，茎叶花色，品品不同。宋人刘蒙全、范致能、史正志皆有菊谱，亦不能尽收也。”据此可以看出，宋代菊花品种已相当丰富。又考苏颂“南阳菊亦有两种：白菊，叶大似艾叶，茎青，根细，花白，蕊黄；其黄菊，叶似茼蒿，花、蕊都黄。”依其描述，当是范成大《范村菊谱》中收载的栽培药菊邓州白和邓州黄。范氏云：“邓州白，九月末开，单叶双纹，白花中有细蕊，出铃萼中，香比诸菊甚烈，而又正为药中所用，盖邓州菊潭所出尔。”又云：“邓州黄，开以九月末，单叶双纹，深于鹅黄，而浅于郁金，中有细叶，出铃萼上，形样甚似邓州白，但差小尔。”所述与苏氏完全一致。《范村菊谱》除收载了邓州白和邓州黄药菊外，还收载了古本草文献中的甘菊。范氏曰：“甘菊生雍州川泽，开以九月，深黄单叶、间巷小人且能识之。”此处所言之甘菊，显然就是前面考证的甘菊 *Chrysanthemum lavandulifolium*

(Fisch. ex Trautv.) Makino。李时珍对药用菊花品种也做过考证：“大抵惟以单叶味甘者入药，菊谱所载甘菊、邓州黄、邓州白者是矣。”《本草图经》所载的“茎紫而气香，味甚甘”之菊和“南阳白菊与黄菊”，则分别是范成大和李时珍所言的甘菊、邓州白与邓州黄。以上三菊被《范村菊谱》收载，可见宋代药用菊花已有栽培。邓州白、邓州黄和甘菊，也许就是我国栽培菊中较早选育出来的药用菊花。它们的培育成功，不仅丰富了菊花品种，而且为后来发展毫菊、滁菊、贡菊、杭菊、怀菊、川菊等提供了优良的种质资源。至于苏颂所述“南京又有一种开小花，花瓣下如小珠子，谓之珠子菊”的品种，经考证此菊乃属甘菊 *Chrysanthemum lavandulifolium* (Fisch. ex Trautv.) Makino 之类，其花小是因生长环境不良所致。清代赵学敏认为，此菊为“杭城石罅生菊，枝叶极瘦小，九月开花如豆，香而且甘的城头菊”。

由于宋代艺菊的发展，推动了药用菊花品种的选育和生产，随着栽培区的不断扩大、产量与质量的提高，从而使菊 *Chrysanthemum morifolium* Ramat. 逐渐成为宋以后药用菊花的主流品种。陈嘉谟《本草蒙筌》记载：“山野间，味苦茎青，名苦薏勿用；家园内味甘茎紫，谓甘菊，堪收。”李时珍《本草纲目》云：“甘菊始生于山野，今人皆栽植之。”可见，明代药用菊花已广为栽培，野生菊花已不再作为甘菊药用，仅作野菊用。至于栽培菊的品种，当是经人工长期选育栽培出来

具有较高药用价值的菊 *Chrysanthemum morifolium* Ramat.。吴仪洛《本草从新》云：“家园所种，杭产者良。”赵学敏《本草纲目拾遗》云：“杭州钱塘所属良渚桧葬地方，乡人多种菊为业，秋十月采取花，挑入城市以售。”凌奐《本草害利》云：“滁州菊，单瓣色白味甘者为上。杭州黄白茶菊，微苦者次之。”以上文献记载可见，清代是药用菊花栽培最盛时期，也是形成道地药用菊花品种的重要阶段。经过自然和人工选择，一些优良的品种勃然兴起，并形成了固定的产地，如河南的怀菊，安徽的亳菊、滁菊、贡菊，浙江的杭菊，四川的川菊，都是在这个时期发展起来的，但有些品种早在清以前已产生，如怀菊、亳菊等。

综上所述，宋以前我国药用菊花应是野生品甘菊 *Chrysanthemum lavandulifolium* (Fisch. ex Trautv.) Makino。宋代栽培菊 *Chrysanthemum morifolium* Ramat. 已出现，并作药用。明清时期是药用菊花栽培和发展的最盛时期，也是形成道地药用菊花品种的重要阶段。随着栽培区的扩大、产量与质量的提高，最终使栽培菊 *Chrysanthemum morifolium* Ramat. 完全取代了野生菊类。

【产地沿革】宋以前我国药用菊花取之于野生品，主要分布在河南、山西、福建、陕西等地。宋代的菊花品种明显多于以前，邓州白、邓州黄和甘菊可能是我国栽培菊中较早选育出来的药用菊，它们的栽培成功，不仅丰富了菊花品种，而且

为后来发展亳菊、滁菊、贡菊、杭菊、怀菊、川菊等提供了优良的种质资源。清代《滁州志》记载：“甘菊产大柳者佳，谓胜于杭产，而不可多得……大柳镇产的菊花饮之，可以清热，名曰滁菊，颇为药商所重。”民国时期《本草正义》记载：“此菊为滁邑特产，色白而气味不烈，清芬微甘，能和肝阴、润肝燥，近世医家甚重之。”《增订伪药条辨》记载：“白滁菊出安徽滁州者……其花瓣细软千层，花蕊小，嫩黄色，花蒂绿，尖小而平。气芬芳，味先微苦后微甘。口含后，香气甚久不散为最佳。”《药物出产辨》记载：“白菊，再有一种名绿蒂菊，产安徽滁州。又名滁州菊，味最清凉。不甜不苦，白菊之中以此味合药为恰当。”《祁州药志》记载：“滁菊花，亦白菊花之一种，产于滁州或其集散地。”清代滁州大柳已有栽培菊花，滁菊被认为品质较好。民国时期在安徽滁州周边地区形成滁菊道地产区。滁菊产地沿革见表 1。

表 1 滁菊产地沿革

年代	出处	产地及评价
清	《本草害利》	滁州菊
	《滁州志》	甘菊产大柳者佳
民国	《本草正义》	此菊为滁邑特产
	《增订伪药条辨》	白滁菊出安徽滁州者
	《药物出产辨》	产安徽滁州
	《祁州药志》	产于滁州或其集散地

【道地产区】以安徽滁州南谯、全椒为中心，核心区域包括滁河流域、池河流域及周边地区。

【性状特征】滁菊呈不规则球形或扁球形，直径1.5cm-2.5cm。舌状花类白色，不规则扭曲，内卷，边缘皱缩，有时可见淡褐色腺点；管状花大多隐藏。体轻，质柔润，干时松脆。气清香，味甘、微苦。

滁菊与其他产地菊花性状鉴别要点见表 2。

表 2 滁菊与其他产地菊花性状鉴别要点

比较项目	滁菊	亳菊	怀菊	贡菊	杭菊
外形	呈不规则球形或扁球形，直径1.5cm-2.5cm	呈倒圆锥形或圆筒形，有时稍压扁呈扇形，直 径1.5cm-3cm，离散	呈不规则球形或扁球形，直 径1.5cm-2.5cm	呈扁球形或不规则球形，直 径1.5cm-2.5cm	呈碟形或扁球形，直 径2.5cm-4cm，常数个相连成片
舌状花	舌状花类白色，不规则扭曲，内卷，边缘皱缩，有时可	舌状花数层，雌性，位于外围，类白色，劲直，	多数为舌状花，舌状花类白色，不规则扭曲，	舌状花白色或类白色，斜升，上部反折，边缘	舌状花类白色或黄色，平展或微折叠，彼此粘连，通

	见淡褐色腺点	上举，纵向折缩，散生金黄色腺点	内卷，边缘皱缩，有时可见腺点	稍内卷而皱缩，通常无腺点	常无腺点
管状花	管状花大多隐藏	管状花多数，两性，位于中央，为舌状花所隐藏，黄色，先端5齿裂	管状花大多隐藏	管状花少，外露	管状花多数，外露