

川骨脂

【药材来源】

本品为豆科植物补骨脂 *Psoralea corylifolia* L. 的干燥成熟果实。

【品种沿革】

补骨脂始载于唐代《药性论》，曰：“婆固脂，一名破故纸，味苦、辛。”简要说明了补骨脂的功效，未描述植物形态和药材性状。五代时期《日华子本草》描述补骨脂：“南番者色赤，广南者色绿。”指出在广南及南番皆有补骨脂。“广南”现指广西、云南、福建等地区；“南番”现指南海外国，《日华子本草》突出了两者品种形态上的颜色差异。宋代《开宝本草》记载：“补骨脂，一名破故纸，生广南诸州及波斯国，树高三四尺，叶小似薄荷。其舶上者佳。”对补骨脂原植物形态做了简要的介绍，认为进口品种质量较佳。该书始将“补骨脂”作为药材正名，“破故纸”为别名。宋代《本草图经》曰：“补骨脂……今岭外山间多有之。茎高三四尺，叶似薄荷，花微紫色，实如麻子圆扁而黑。”写到了补骨脂的生境“山间”，并记载了补骨脂的植物形态，确认为现代豆科植物补骨脂 *Psoralea corylifolia* L.。

明代《本草蒙筌》曰：“生广西诸州，子圆扁而绿。”记载了补骨脂药材的形态“圆扁而绿”。徐春甫《古今医统大全》卷九十三经验秘方中已有了“川骨脂”的记载，该书成

于嘉靖三十五年（1556），说明至明代我国已经有了引种栽培成功，而且成为了道地药材的“川骨脂”。清代《本草易读》曰：“破故纸，茎高三四尺，叶小似薄荷。花微黑色，实如麻子圆扁而黑，九月采。”可见，古代医家对补骨脂的描述相似，均与现今植物形态相一致。

综上，依据历代本草的记载，补骨脂为豆科植物补骨脂 *Psoralcea corylifolia* L.，为外来中药材，后来引进栽培。明清以来，医家对“川骨脂”较为推崇，因此，本标准将补骨脂的道地药材定为“川骨脂”。

【产地沿革】

五代时期《日华子本草》描述：“南番者色赤，广南者色绿。”指出在广南及南番皆有补骨脂。“广南”现指广西、云南、福建等地区；“南番”现指南海外国。宋代《开宝本草》始称“补骨脂”：“补骨脂，一名破故纸，生广南诸州及波斯国……其舶上者佳。”其中记载了补骨脂的产地为“广南诸州及波斯国”，即现广西、云南、福建地区和伊朗等，且认为国外伊朗等地的产补骨脂质量佳。宋代《本草图经》曰：“补骨脂，生广南诸州及波斯国，今岭外山间多有之，不及蕃舶者佳。”其记载与《开宝本草》一致。宋代寇宗奭《本草衍义》记载：“补骨脂产于梧州。”产地更为具体，为梧州（今广西壮族自治区梧州市）。

明代刘文泰《本草品汇精要》记载：“此物本自外番随海舶而来，非中华所有，番人呼为补骨鵠，语讹为破故纸也。

【地】〔图经曰〕出波斯国，今广南诸州及岭外山坂间。〔道地〕南蕃梧州。”转述了《本草图经》的记述，说明补骨脂的产地一直为海外和“广南”。《本草蒙筌》曰：“生广西诸州，子圆扁而绿。”《本草汇言》曰：“补骨脂，即破故子也。生波斯国，及岭南诸州。今岭外山坂间，多有之，四川台州亦有，皆不及番舶者佳。”开始记载四川地区也有补骨脂。明代著名医家缪希雍所著《先醒斋医学广笔记》中治肾阳火衰无子的“种子方”就指名要用“真合州补骨脂”。合州即今重庆市合川区，地处嘉陵江、涪江、渠江三江汇合之处，该地区曾经为四川省合川县。清代《本草易读》云：“破故纸……生岭南及波斯，今四川合州亦有之。”

民国时期《药物出产辨》云：“故纸，产四川为最，河南、安徽次之。架喇吉打来者又次，名洋故纸。五月出新。”

《中华本草》收载补骨脂：“产于四川合川、江津、金堂、都江堰、广元，河南商丘、新乡、博爱、信阳，安徽六合、阜阳，陕西兴平等地亦产，销全国。江西、云南、山西等省亦产，多自产自销。”《四川道地中药材志》也收载了合川补骨脂。

综合以上文献考证，补骨脂为外来中药材，主要来自波斯国，即伊朗一带。后来引进栽培，主要在“梧州”“合州”等地。“川骨脂”是自明代始临床长期应用优选出来的道地品种，明清以来医家对“川骨脂”较为推崇。川骨脂主产于重庆合川、江津，四川金堂、广元、都江堰，也称“川故子”。

合川、江津、金堂、都江堰、广元为中心的区域及其周边地区成为补骨脂的道地产区。川骨脂产地沿革见表1。

表1 川骨脂产地沿革

年代	出处	产地及评价
五代	《日华子本草》	南番者色赤,广南者色绿
宋	《开宝本草》	生广南诸州及波斯国,其舶上者佳
	《本草衍义》	产于梧州
明	《本草品汇精要》	出波斯国,今广南诸州及岭外山间。〔道地〕 南番梧州
	《先醒斋医学广笔记》	真合州补骨脂(合州即今重庆合川)
清	《本草易读》	今四川合州亦有之
民国	《药物出产辨》	产四川为最,河南、安徽次之
现代	《中华本草》	产于四川合川、江津、金堂、都江堰、广元,河南商丘、新乡、博爱、信阳,安徽六合、阜阳,陕西兴平等地亦产,销全国。江西、云南、山西等省亦产

【道地产区】

合川、江津、金堂、都江堰、广元及其周边地区。

【性状特征】

补骨脂呈肾形,略扁,长3mm-5mm,宽2mm-4mm,厚约1.5mm。表面微鼓起,黑褐色,具细微网状皱纹。先端圆钝,有一小突起,凹侧有果梗痕。质硬。果皮薄,与种子不易分离;种子1,

子叶 2, 黄白色。气香, 味微咸、微苦。

川骨脂呈肾形, 略扁, 表面黑色、黑褐色或灰褐色, 具细微网状皱纹。顶端圆钝, 有一小突起, 凹侧有果梗痕。质硬。果皮薄, 与种子不易分离; 种子 1, 子叶 2, 黄白色, 有油性。气香, 味辛、微苦。